



**Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity
zaplevelení v provozních podmínkách**
Opravný list DP

Vedoucí práce:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Vypracoval:
Bc. Radek Punčochář

Brno 2017

Str. 38–44 tab. 15-23 uveden název pšenice obecná, má tam být pšenice ozimá

Str. 50-58 tab. 35-44 uveden název pšenice obecná, má tam být pšenice ozimá

Str. 66 Obr. 4 Vliv hustoty porostu ozimé pšenice na zaplevelení (Trace = 0,014; F-ratio= 0, 953; P-value = 0, 461), má být Obr. 4 Vliv hustoty porostu ozimé řepky na zaplevelení (Trace = 0,014; F-ratio= 0, 953; P-value = 0, 461)

Str. 70 Erodizm cicutarium-Erodium cicutarium, Galizm aparine-Galium aparine, Pisum satvum-Pisum sativum, Lamyum purpureum-Lamium purpureum

Název druhu			
Český	Vědecký	Český	Vědecký
Heřmánkovec nevonný	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Penízek rolní	<i>Thlaspi arvense</i>
Hluchavka nachová	<i>Lamium purpurea</i>	Pryšec kolovratec	<i>Euphorbia cyparissias</i>
Hrách setý	<i>Pisum sativum</i>	Přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>
Kakost dvousečný	<i>Geranium dissectum</i>	Psárka rolní	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Kakost holubičí	<i>Geranium columbinum</i>	Pšenice ozimá	<i>Triticum aestivum</i>
Kokoška pastuší tobolka	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Ptačinec prostředí	<i>Stellaria media</i>
Konopice rolní	<i>Galeopsis ladanum</i>	Pumpava rozpuková	<i>Erodium cicutarium</i>
Kostival lékařský	<i>Symphytum officinale</i>	Pýr plazivý	<i>Elymus repens</i>
Lipnice roční	<i>Poa annua</i>	Rdesno červivec	<i>Persicaria maculosa</i>
Mák vřtčí	<i>Papaver somniferum</i>	Řepka ozimá	<i>Brassica napus var. Napus</i>
Merlík tuhý	<i>Chenopodium strictum</i>	Sítina žabí	<i>Juncus bufonius</i>
Mléč rolní	<i>Sonchus arvensis</i>	Svízel přítula	<i>Galium aparine</i>
Mléč zelinný	<i>Sonchus oleraceus</i>	Šťovík kadeřavý	<i>Rumex crispus</i>
Opletka obecná	<i>Fallopia convolvulus</i>	Truskavec obecný	<i>Polygonum arenastrum</i>
Oves hluchý	<i>Avena fatua</i>	Violka rolní	<i>Viola arvensis</i>